

**ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΥΠΑΡΞΗ
ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΟΣ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
(Πρόδρομη Ανακοίνωση)**

**Χ. ΜΑΝΕΣ, Μ. ΨΑΛΛΑΣ, ΣΤ. ΓΕΩΡΓΑ,
Π. ΓΡΙΝΤΖΟΥ, Γ. ΤΖΑΤΖΑΓΟΥ,
Ν. ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΟΥ Ν. ΚΑΡΑΤΖΑΣ**

**ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ,
Γ.Ν.«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Οι κυριότεροι παράγοντες για την εμφάνιση διαβητικού έλκους είναι η περιφερική νευροπάθεια και η αποφρακτική αγγειακή νόσος
- Η εμφάνιση οστεομυελίτιδας αποτελεί παράγοντα που συντελεί σε αποτυχία της συντηρητικής θεραπευτικής αγωγής και επακόλουθο ακρωτηριασμό.
- Η περιφερική αγγειοπάθεια αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου για ακρωτηριασμό.

- 1 . Newman LG, Waller J, Palestro CJ, et al. Unsuspected osteomyelitis in diabetic foot ulcers. Diagnosis and monitoring by leukocyte scanning with indium in 111 oxyquinoline. JAMA 1991 ;266: 1246-1251.
2. Hill SL, Holtzman GI, Buse R. The effects of peripheral vascular disease with osteomyelitis in the diabetic foot. Am J Surg 1999; 177:282-286.

ΣΚΟΠΟΣ

- Η διερεύνηση της πιθανής συμβολής της περιφερικής ισχαιμίας στην τεκμηριωμένη ύπαρξη οστεομυελίτιδας.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ (1)

Πίνακας 1: Κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά

N	28
Φύλο (Α) n	21
Τύπος (2) n	21
Ηλικία(έτη)	67,7 ± 9,4
Διάρκεια (έτη)	21,7 ± 10


Μέθοδοι

- Η επιβεβαίωση ή όχι της οστεομυελίτιδας έγινε με τη χρήση σπινθηρογραφήματος με επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια
- Η εκτίμηση της περιφερικής αγγειοπάθειας έγινε κλινικά με την εκτίμηση του Σφυροβραχιόνιου Δείκτη ($ABI < 0,9$)

Αποτελέσματα (1)

	Οστεομυελίτιδα (ναι)	Οστεομυελίτιδα (όχι)
	17	11
Περιφερική αγγειακή νόσος (ναι)	8	9

Αποτελέσματα (2)



Συμπέρασμα

- Στην παρούσα πρόδρομη μελέτη δεν διαπιστώθηκε συμβολή της περιφερικής αγγειακής νόσου στην εμφάνιση οστεομυελίτιδας